

**Мониторинг ситуации в подведомственных учреждениях департамента культуры и туризма администрации
города Липецка**

	Количество сотрудников, обратившихся в медицинское учреждение	Количество отстранённых от работы сотрудников	Количество сотрудников, побывавших за рубежом в период последних 3 недель	Количество сотрудников прибывших из заграничной поездки начиная с 11.03.2020
Учреждение				

Порядок проведения уборки (дезинфекции) помещений в учреждениях, подведомственных департаменту культуры и туризма администрации города Липецка

Уборка помещений (кабинеты, коридоры, классы, актовые, зрительные залы, фойе и т.д.)	
Вне эпидемиологической ситуации	
1	<p>Ежедневная влажная уборка с моющими средствами утром и после работы, дополнительно после проведения мероприятий.</p> <p>Ежедневная влажная уборка проводится: В начале рабочего дня с использованием моющих средств, в середине и в конце рабочего дня с применением специальных дезинфицирующих средств; в туалетах уборка проводится не менее 3 раз в день с применением специальных дезинфицирующих средств: сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей, вентили кранов, раковины, обрабатываются ветошью, ручки сливных бачков и ручки дверей в дезинфицирующем растворе; раковины, унитазы чистятся ветошью или щетками с чистяще-дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке, в соответствии с указаниями на этикетке; полы в туалете моются с применением дезинфицирующих средств. Дверные ручки всех помещений, входных дверей, выключатели, перила лестничных маршей, подоконники обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств в конце рабочего дня. Уборочный инвентарь (ветошь, щетки, ерши) после каждого использования обеззараживается в дезинфицирующем растворе. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкцией по их применению по режиму воздействия на вирусы при открытых окнах.</p> <p>Ежедневное обеззараживание всех помещений. Дезинфекция - по режиму соответствующей инфекции (бактерии, вирусы).</p>
2	<p>Генеральная уборка техническим персоналом 1р. в месяц во всех видах помещений учреждения - (график)</p>
3	<p>Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями.</p>
4	<p>По окончании уборки инвентарь промывают, ополаскивают и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.</p>

1. Для проведения уборки и дезинфекции в учреждении используют моющие и дезинфицирующие средства, соблюдая инструкции по их применению.

2. Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах. Дезинфицирующую

щие и моющие средства хранят в упаковке производителя в недоступных местах.

3. Все работы со средствами производятся с защитой кожи рук резиновыми перчатками. Все ёмкости с растворами следует закрывать крышками, хранить в тёмном сухом недоступном месте.

4. Рабочие растворы готовятся в эмалированной, стеклянной, пластиковой емкостях, строго соблюдая инструкцию по их применению.

К растворам, применённым к обеззараживанию поверхностей, возможно добавление 0.5% моющего средства;

5. В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации рекомендуется размещать при входе в учреждение для посетителей и работников для обработки кожи рук антисептические средства (велодепт, техносепт, альсептав и др.).

Режим дезинфекционной обработки дез. средствами при ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

№ п/п	«Жавельон»						«Део-хлор»			«Ника-экстра М профи			
	Объект обеззараживания	Способ обеззараживания	Концентрация раствора в %	Количество средства на 10 л воды в табл.,шт.	Время обеззараживания мин.	Концентрация раствора в %	Количество средства на 10 л воды в табл.,шт.	Время обезраживания в мин	Концентрация раствора в %	Количество сред-ства на 10 л воды в мл	Время обезра-живания мин.		
1	Поверхности в (пол, стены, предметы обстановки)	Протирание или орошение	0,015	1	45	0,015	1	45	0,25	25	60		
2	Санитарно-техническое оборудование (раковины, унитазы)	2-х кратное протирание или орошение с интервалом 15 мин	0,015	1	45	0,015	1	45	0,5	50	30		
			0,03	2	30	0,03	2	30	1,0	100	15		
5	Уборочный инвентарь: ве-швабры, тошь, щетки	Замачивание, проти-рание, по-гружение	0,015	1	45	0,015	1	45	0,25	25	90		
			0,03	2	30	0,03	2	30	0,5	500	60		
											100	30	
											Срок годности рабочих растворов - 28 суток при закрытой ёмкости.		
											Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-		

Срок годности рабочих растворов средства – 9 суток.

По окончании дезинфекции- влажная уборка; помещения проветривают; паркетный пол, деревянную мебель протирают сухой ветошью

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗИНФЕКЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлору, аллергическими заболеваниями и хроническими заболеваниями легких и верхних дыхательных путей.
- При работе со средством следует избегать его попадания на кожу и в глаза.
- Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
- Все виды работ с растворами от 0,015% до 0,03% концентрации активного хлора можно проводить без средств защиты органов дыхания.
- При работе с растворами способом протирания, содержащими от 0,1% активного хлора и выше, для защиты органов дыхания следует использовать универсальные респираторы типа РУ- 60М или РПН -67 с патроном марки В, глаза защищать герметичными очками.
- Обработку поверхностей в помещениях следует проводить в отсутствие людей. По окончании дезинфекции следует провести влажную уборку и проветривание до исчезновения запаха хлора. **Дезинфекцию поверхностей способом протирания растворами, содержащими 0,015% активного хлора, можно проводить в присутствии людей.**

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 мин. и закапать 30% раствор сульфацила натрия.
- При несоблюдении мер предосторожности возможно раздражение верхних дыхательных путей. Пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или «Боржом»).
- При попадании средства на кожу обильно промыть пораженное место водой и смазать ее смягчающим кремом.
- При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу